

## Projet

### Formalisation et étude de l'arithmétique de Peano en Coq

Le projet devra être réalisé sur machine, le rapport final comprendra une spécification des différents points demandés (définitions, énoncés des résultats sans les preuves) accompagnée de commentaires. Ce rapport sera rendu lors du dernier cours le **25 janvier 2005**, et l'ensemble des fichiers Coq devra être envoyé par courrier électronique à l'adresse `filliatr@lri.fr` avec le sujet « `projet cours 2-7` ».

## 1 Objectif

L'objectif de ce projet est d'étudier comment certaines preuves effectuées dans l'arithmétique de Peano classique (c'est-à-dire avec le tiers-exclu) peuvent être rendues constructives et ainsi interprétées en Coq.

Cet exemple de taille moyenne vous permettra de vous familiariser avec les éléments essentiels du Calcul des Constructions Inductives et d'un assistant à la démonstration.

C'est par ailleurs l'occasion d'étudier de près un résultat méta-théorique connu, dans un cadre original.

## 2 L'arithmétique de Peano

Il s'agit d'un système formel ancien (1889) ; on trouvera une traduction, du latin vers l'anglais, de l'article originel dans [6]. On trouvera également une présentation plus récente dans [3]. Il s'agit surtout d'un système formel à la fois particulièrement concis, et néanmoins expressif, ce qui en fait un objet d'étude apprécié et appréciable.

Ce système vise à formaliser l'arithmétique des entiers naturels, jusqu'aux preuves par récurrence. Formellement, il s'agit d'un système de logique du premier ordre, avec quatre constantes de fonctions :

- 0, d'arité zéro,
- S, d'arité un,
- + et \*, d'arité deux.

On utilisera la notation infixe habituelle pour les fonctions + et \*. On dispose par ailleurs d'un seul symbole de prédicat, l'égalité. C'est bien sûr un prédicat binaire et là encore on utilisera la notation infixe habituelle.

Les règles de déduction sont le calcul des prédicats habituel. On note  $\neg P$  pour  $P \Rightarrow \perp$ . Les axiomes, connus sous le nom « d'axiomes de Peano » sont les suivants :

1.  $\forall x. \neg S(x) = 0$
2.  $\forall x. \exists y. (\neg x = 0 \Rightarrow S(y) = x)$
3.  $\forall x. \forall y. (S(x) = S(y) \Rightarrow x = y)$
4.  $\forall x. x + 0 = x$
5.  $\forall x. \forall y. S(x) + y = S(x + y)$

6.  $\forall x.(0 * x = 0)$   
 7.  $\forall x.\forall y.S(x) * y = (x * y) + y$

auxquels s'ajoute le schéma d'axiomes suivant (récurrence) :

$$P(0) \Rightarrow (\forall x.P(x) \Rightarrow P(S(x))) \Rightarrow \forall x.P(x)$$

paramétré par un prédicat quelconque  $P$ . Finalement, on dispose des propriétés habituelles de l'égalité (réflexivité, élimination).

Même si Peano s'intéressait originellement à la logique classique, le calcul des prédicats utilisé peut être respectivement minimal, intuitionniste ou classique. On parlera donc d'*arithmétique de Peano* pour la version classique du formalisme, et d'*arithmétique de Heyting* pour sa contrepartie intuitionniste ; ou simplement d'arithmétique classique, respectivement intuitionniste.

### 3 Formalisation de l'arithmétique de Peano en Coq

La première étape du travail consiste à formaliser en Coq ce qu'est une démonstration dans l'arithmétique de Peano. Pour cela, on devra, au moins, définir deux types correspondant respectivement aux représentations des objets et des propositions de l'arithmétique.

Voici quelques indications et conseils.

#### 3.1 Représentation des variables

La présence de quantificateurs nécessite la définition d'une opération de substitution. Il faut donc traiter les problèmes de capture de variables, d' $\alpha$ -conversion, etc. Une possibilité pour cela est d'utiliser une notation à base d'indices de de Bruijn. Cette solution peut paraître relativement lourde au début, mais évite en général des mauvaises surprises par la suite.

Si l'on choisit une représentation à base de de Bruijn, il est nécessaire de définir des opérations de relocation (*lifting*) pour construire la substitution, et de prouver quelques propriétés sur ces opérations. Nous conseillons de s'inspirer des travaux de Gérard Huet pour formaliser le  $\lambda$ -calcul [5], plus tard repris par Thorsten Altenkirch puis Bruno Barras [1, 2].

Dans la définition des dérivation en Coq, seules les règles portant sur les quantificateurs font intervenir les opérations sur les indices de de Bruijn. Une possibilité est d'indiquer explicitement dans le contexte les liaisons de variables. Par exemple :

```
Inductive Ctxt : Set :=
  nilc : Ctxt
| intc : Ctxt -> Ctxt
| assume : Pformula -> Ctxt -> Ctxt.
```

L'idée est, comme dans Coq, de lier les variables de termes explicitement dans le contexte. Par exemple, le contexte

$$[x : \text{nat}; x = 0; y : \text{nat}; y = y]$$

est représenté par

```
(assume (eqp (var 0)(var 0)) (intc (assume (eqp (var 0) 0t) (intc nilc))))
```

où `var` est le constructeur de terme correspondant aux variables, `0t` la constante 0 et `eqp` le constructeur du type des formules d'égalité.

La règle d'élimination du quantificateur existentiel devient alors :

$$\frac{\Gamma \vdash \exists.A \quad (\text{intc}(\Gamma)) :: A \vdash C \uparrow^1}{\Gamma \vdash C}$$

où  $\uparrow^1$  est l'opération consistant à augmenter de 1 tous les de Bruijn correspondant à des variables libres.

### 3.2 Formalisation du calcul des prédicats

L'un des buts étant de traduire par la suite les représentations des démonstrations dans l'arithmétique en de vraies démonstrations Coq, il est plus rationnel d'utiliser la déduction naturelle. Nous rappelons les règles de la déduction naturelle en figure 1.

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\Gamma :: A \vdash A} \text{ (ASSUME)} \quad \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma :: B \vdash A} \text{ (WEAK)} \\
\frac{\Gamma :: A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (IMP-I)} \quad \frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (IMP-E)} \\
\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \text{ (AND-I)} \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \text{ (AND-L-E)} \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} \text{ (AND-R-E)} \\
\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \text{ (OR-L-I)} \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \text{ (OR-R-I)} \quad \frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma :: A \vdash C \quad \Gamma :: B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \text{ (OR-E)} \\
\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (BOT-E)} \\
\frac{\Gamma \vdash A \quad x \notin \Gamma}{\Gamma \vdash \forall x.A} \text{ (FORALL-I)} \quad \frac{\Gamma \vdash \forall x.A}{\Gamma \vdash A[x \setminus t]} \text{ (FORALL-E)} \\
\frac{\Gamma \vdash A[x \setminus t]}{\Gamma \vdash \exists x.A} \text{ (EXIST-I)} \quad \frac{\Gamma \vdash \exists x.A \quad \Gamma :: A \vdash B \quad x \notin \Gamma :: B}{\Gamma \vdash B}
\end{array}$$

FIG. 1 – La déduction naturelle

### 3.3 Logiques intuitionniste et classique

On demande en fait de coder *deux* formalismes. Les arithmétiques de Peano et de Heyting. Plutôt que de dupliquer la définition des règles d'inférence, il paraît judicieux de paramétrer la définition de la déduction naturelle par un ensemble d'axiomes (et schéma d'axiomes). Cet ensemble pouvant alors par la suite être instancié

- soit par les axiomes de Peano,
- soit par les axiomes de Peano enrichis de la règle du tiers exclu.

Ces deux instanciations correspondant, bien sûr, aux arithmétiques de Peano et de Heyting.

## 4 Réflexion

### 4.1 Principe

Le principe de la réflexion est de traduire dans le méta-formalisme (ici Coq) les constructions faites dans le formalisme représenté (ici l'arithmétique de Peano). D'un point de vue externe, il est bien clair que Coq est une extension de l'arithmétique de Peano intuitionniste ; on cherche donc à matérialiser cela.

Pour illustrer cela, notons  $\forall x. \exists y. x = S(y) \vee x = 0$  la proposition de l'arithmétique de Peano, c'est-à-dire un objet d'un type nommé par exemple `Pformula` qui aura été défini dans la première partie du travail. On définira donc une fonction, notée par exemple `tr`, telle que `(tr  $\forall x. \exists y. x =$`

$S(y) \vee x = 0$ ) se réduise vers l'objet de type `Prop` suivant :

$$\text{forall } x:\text{nat}, \text{ exists } y:\text{nat}, x=S \ y \ \backslash / \ x=0$$

(ou `forall x:nat, { y:nat | x=S y \ / x=0 }` si vous avez travaillé dans `Set`).

## 4.2 Questions : implantation

On demande dans un premier temps d'écrire en Coq les fonctions de réflexion. Ensuite, de prouver que s'il existe une dérivation dans l'arithmétique de Peano intuitionniste d'une formule  $P$  dans un contexte  $\Gamma$ , alors il existe un terme Coq de type  $\text{tr}(\Gamma) \rightarrow \text{tr}(P)$ . C'est cette dernière étape qui constitue la réflexion proprement dite.

## 4.3 Questions : théorie

Indiquez informellement ce que l'existence de cette fonction implique logiquement par rapport aux formalismes logiques que sont l'arithmétique intuitionniste et Coq. Pourrait-on définir l'inverse de cette fonction ?

# 5 Arithmétique classique

Il n'est pas possible de réfléchir l'arithmétique classique dans Coq de la même manière. En revanche, on dispose d'un certain nombre de résultats partiels. On se propose d'étudier cela dans cette partie.

On sait depuis longtemps qu'il est possible de plonger un formalisme classique dans sa contrepartie intuitionniste. Pour cela, on affaiblit les propositions prouvées classiquement. Voici quelques principes qui sous-tendent ces constructions :

- On obtient un système équivalent au système classique en ajoutant l'axiome du tiers-exclu au système intuitionniste. Mais on peut également utiliser le schéma d'axiome suivant : pour toute proposition  $P$ ,  $\neg\neg P \Rightarrow P$ .
- Cet axiome n'est donc, bien sûr, pas prouvable intuitionnistiquement. En revanche, il est vrai en logique intuitionniste que  $\neg\neg\neg P \Rightarrow \neg P$ .

L'idée est donc de rajouter, à tous les niveaux d'une proposition, un certain nombre de double négations. On obtient alors, à partir d'une proposition  $P$ , une proposition affaiblie  $\overline{P}$  telle que :

1.  $P \Rightarrow \overline{P}$  est vrai de manière intuitionniste,
2. la transformée du tiers-exclu, ou le schéma de propositions  $\overline{\neg\neg P} \Rightarrow \overline{P}$ , sont également prouvables de manière intuitionniste.

En conclusion, si  $P$  est prouvable dans l'arithmétique classique, alors  $\overline{P}$  est prouvable dans l'arithmétique intuitionniste.

On se propose de formaliser ces résultats dans Coq. Le paragraphe suivant présente une adaptation, au cadre de Coq, d'un résultat du logicien américain H. Friedman [4].

## 5.1 Une présentation de la traduction de Friedman

Soit  $A$  une proposition de l'arithmétique. On note  $\neg^A P$  la proposition  $P \Rightarrow A$ . À toute proposition  $P$  de l'arithmétique, on associe la proposition  $P^A$ , définie par les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \perp^A &\equiv \perp \vee A \\ t_1 = t_2^A &\equiv t_1 = t_2 \vee A \\ (P_1 \wedge P_2)^A &\equiv \neg^A \neg^A (P_1^A) \wedge \neg^A \neg^A (P_2^A) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(P_1 \vee P_2)^A &\equiv \neg^A \neg^A (P_1^A) \vee \neg^A \neg^A (P_2^A) \\
(P_1 \wedge P_2)^A &\equiv \neg^A \neg^A (P_1^A) \wedge \neg^A \neg^A (P_2^A) \\
(P_1 \Rightarrow P_2)^A &\equiv \neg^A \neg^A (P_1^A) \Rightarrow \neg^A \neg^A (P_2^A) \\
(\forall x.P)^A &\equiv \forall x. \neg^A \neg^A (P^A) \\
(\exists x.P)^A &\equiv \exists x. (P^A)
\end{aligned}$$

**Lemme 1** *On étend, de manière triviale, la transformée par double négation aux contextes. S'il existe une dérivation de  $\Gamma \vdash P$  dans l'arithmétique de Peano, il existe une dérivation de  $\Gamma^A \vdash \neg^A \neg^A (P^A)$  dans l'arithmétique de Heyting.*

**Lemme 2** *Les formules sans quantificateur sont décidables (en particulier dans Coq).*

**Lemme 3** *Soit  $P$  une formule sans quantificateur. On a, dans Coq,  $P^A \iff P \vee A$ .*

Soit alors une preuve classique de  $\exists x.P(x)$ , où  $P$  est une formule sans quantificateur ; une telle proposition est dite  $\Sigma_0^1$ . D'après le lemme 1, on a donc une preuve intuitionniste de  $\neg^A \neg^A \exists x.P^A(x)$ , c'est-à-dire

$$((\exists x.P^A(x)) \Rightarrow A) \Rightarrow A.$$

En instanciant  $A$  par la proposition originelle  $\exists x.P(x)$ , et après réflexion, on obtient donc :

$$((\exists x : \mathbf{nat}. P^{\exists x : \mathbf{nat}. P(x)}(x)) \Rightarrow \exists x : \mathbf{nat}. P(x)) \Rightarrow \exists x : \mathbf{nat}. P(x)$$

ce qui d'après le lemme 3 est équivalent à  $\exists x.P(x)$ .

On a donc ainsi obtenu une preuve intuitionniste de  $\exists x : \mathbf{nat}. P(x)$  à partir d'une preuve classique de la même proposition.

En considérant le même développement avec des variables libres, on étend ce résultat aux formules  $\Pi_0^2$ , c'est-à-dire de la forme

$$\forall x. \exists y. P(x, y)$$

où  $P$  est sans quantificateur.

## 5.2 Questions

1. Définir la non-non-traduction dans Coq.
2. Prouver que si  $\Gamma \vdash P$  est prouvable dans l'arithmétique classique, alors, pour tout  $A$ ,  $\Gamma^A \vdash P^A$  est prouvable dans l'arithmétique intuitionniste.
3. Soit  $P$  une proposition sans quantificateur. Prouvez que pour toute proposition  $A$

$$P^A \iff P \vee A$$

4. On appelle formule  $\Sigma_1^0$  une proposition de la forme  $\exists x.P(x)$ , où  $P$  est sans quantificateur. Montrer que si une telle formule est prouvable dans l'arithmétique classique, elle l'est aussi dans Coq.

## Références

- [1] B. Barras. Coq en coq. Rapport de Recherche 3026, INRIA, October 1996.
- [2] B. Barras et B. Werner. Coq in coq. Soumis à publication, disponible sur <http://coq.inria.fr/~barras/>, 1997.
- [3] R. Cori et D. Lascar. *Logique Mathématique, Cours et exercices*. Axiomes. Masson, 1993.

- [4] H. Friedman. Classically and intuitionistically provably recursive function. In G.H. Müller and D.S. Scott, editors, *Higher Set Theory*, Oberwolfach, Germany 77, 1978. Springer-Verlag.
- [5] G. Huet. Residual theory in  $\lambda$ -calculus : A complete gallina development. Technical Report 2002, INRIA, 1993.
- [6] J. van Heijenoort. *From Frege to Gödel, A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*. Source Books in the History of Science. Harvard University Press, 1967.